



2026

新品種 & 人気品種ラインナップ



いつもの美味しさ + より作りやすく。

ニュータイプ誕生。


α アルファ
type

α（アルファ）タイプとは？

各産地で長年愛されてきたロングセラー品種の果実品質・栽培性はそのままに、主要病害への耐性を加えた次世代タイプです。

「αタイプ」は、従来の管理体系を変えずに収量の確保と品質の安定を目指します。今後もαタイプのラインナップを拡充してまいります。

-銘品は新時代へ-



POINT 1 病気に強い、収量を守る。

炭疽病とうどんこ病に対する複合耐病性を備えており、気候条件の極端化で病害多発が懸念される現場でも、病害の影響を最小限に抑え、生育後半まで安定した樹勢と収量の確保に貢献します。



POINT 2 変わらない栽培方法。

「αタイプ」は従来品種の特性はそのままに、耐病性だけ加わったことが大きな特徴なので、作型や仕立てなど、栽培方法を変えずに導入でき、品種移行もスムーズです。

更なる収量アップと品質向上を実現します。



POINT 3 おいしさ、そのまま。

耐病性を備えても従来品種らしい味わいはそのまま。甘みやシャリ感、香りや風味など従来の美味しさは変わらず、病気に強い安心だけを新たにプラスしました。

αタイプ第一弾！ 新時代の「祭ばやし」誕生 さらなる安定生産を 複合耐病性で実現



フーコク交配

祭ばやし777 α

(試交名：TM-777)

複合耐病性が付与されたことで、ハウス作型から露地作型まで、炭疽病とうどんこ病の発生が懸念される産地でも、より安心して栽培ができる品種です。

「祭ばやし777」の風味をしっかりと受け継ぎ、同等の食味と品質を備えた新品種です。

αタイプのチカラ、祭ばやし8にも！



フーコク交配

祭ばやし8 α

(試交名：TM-8)

肥大性に優れる
『祭ばやし8』にも、
αタイプ誕生。環境変化にも強く、安定した栽培を実現します。

収穫日数の目安（交配後日数）

●5～6月収穫：52～48日 ●7～8月収穫：48～42日

オススメ作型

ハウス作型後半～大型トンネル作型

前半から中盤まで、幅広い 作型への適応力をもった 複合耐病性「祭ばやし」

フーコク交配

祭ばやしRG α

(試交名：TM-13)



低温期の伸長性・着果性に優れ、「祭ばやしRG」と同等の栽培性を有しています。早い作型での発生が増えるうどんこ病にも強いいため、ハウス作型から露地作型まで幅広い作型に対応します。果実品質も「祭ばやしRG」と同等の高い食味性を有しています。

収穫日数の目安（交配後日数）

●4～5月収穫：55日～50日 ●6～7月収穫：50日～46日

オススメ作型

ハウス作型～中型トンネル作型

きら
夏に煌めく！

「祭ばやし」の味を
継承した高温期向け
複合耐病性品種

フーコク交配

煌夏 -おうか-

(試交名：CR-36)



こんなお悩みありませんか？



猛暑やゲリラ豪雨など極端な天気が多くて、
病気の発生が多い…。草勢維持が難しい。

そのお悩み、**煌夏** が解決します



POINT 1



※2025年7月 千葉県の産地圃場にて

天候急変時でも病気に強い。

天候急変などによる炭疽病・うどんこ病の発生のリスクが高い状況が続いている近年の栽培環境に対して、複合耐病性品種の「煌夏」が収量と品質を守り、安心して長く栽培・出荷ができます。

POINT 2




※2025年8月 山形県の産地圃場にて

高温期でも安定した草勢。

「煌夏」の草勢は「祭ばやしUT」と同等の強さで、高温期でもツル持ちが良く、収量維持に貢献します。特に露地の多ヅル栽培を行う作型に適した安定生産型の品種です。

POINT 3



祭ばやしらしい味わい。

「祭ばやし」らしい上質な味わいと安定した糖度を備え、淡いピンク系の果肉色で高温期も赤みが強く出すぎず、ウルミ果の発生も抑制します。
また、種周りの緩みも少なく在圃性に優れます。

収穫日数の目安（交配後日数）

5～6月収穫：52日～48日

7～8月収穫：48日～42日

オススメ作型

大型トンネル作型～露地作型・抑制作型

Next season's Variety

トンネル作型に適し、
うどんこ病耐病性と
高温耐暑性を備えた
高糖度大玉品種

フーコク交配

TK-40

POINT1

味を追求、高糖度で甘さ際立つ！

従来品種と比較し、突出した高糖度を誇る甘さバツグンの品種です。風味も良く、食味全体のバランスに優れた品種です。



※2025年7月に当社で収穫された果実

POINT2

耐病性を備えた、安心の栽培性

TK-40は後半までツル持ちの良い草勢とうどんこ病耐病性を備え、高温期でも安定した栽培が可能です。草勢低下のリスクが低く、裂果やウルミ果の発生も少ない品種です。

収穫日数の目安（交配後日数）

●5～6月収穫：50～47日 ●7～8月収穫：47～42日

オススメ作型

ハウス後半～トンネル作型・抑制作型

ユウガオ台木

フーコク交配

も さい
猛者



初期から後半まで栽培期間通して
強く安定！盛夏期の栽培に最適！

POINT1 当社ユウガオ台木で最も草勢が旺盛

当社ユウガオ台木品種の中で、最も草勢が旺盛で、カボチャ台木と同等の草勢・ツル持ちが期待できます。

POINT2 初期から強く安定し、肥大良好

草勢は初期から強く、交配までに葉面積やツルの勢いの確保が容易で、初期肥大に優れます。

POINT3 草勢は旺盛だが、栽培は安定する

草勢は旺盛ですが、着果は安定し、果実揃いが優れます。後半までのツル持ちにも優れるため可販率や秀品率も向上します。

待望の複合耐病性小玉品種！

フーコク交配

TSW-7

低温期のスペシャリスト。複合耐病性でパワーアップ。



■ 特性

炭疽病・うどんこ病の複合耐病性を備えながら、草勢は中位で、低温期の伸長性と着果性に優れます。

2,3番果獲りでも複合耐病性の効果は持続し、従来罹病性品種よりも収量の安定に貢献します。

■ 対照品種

ひとりじめ7-EX・ひとりじめNEO
スウィートキッズ など

収穫日数の目安（交配後日数）

- 3~4月収穫：48日~40日
- 5~6月収穫：40日~32日
- 7~8月収穫：32~30日

オススメ作型

ハウス~トンネル作型

フーコク交配

TAC-47

強い草勢と複合耐病性で安定栽培・高糖度



■ 特性

複合耐病性と強い草勢を兼ね備えた高温期向け小玉品種です。果皮は「夏のひとりじめ」と同様にやや厚く、弾力性があり、裂皮・裂果が発生しにくいことが特徴です。大玉に近いしっかりとした肉質で、糖度も高く安定しており、食味に優れます。

■ 対照品種

ひとりじめHM
夏のひとりじめ など

収穫日数の目安（交配後日数）

- 5~6月収穫：40日~36日
- 7~8月収穫：36日~30日

オススメ作型

トンネル作型~露地作型



極小種子ナノシードの 中玉 品種

食べきりやすい中玉サイズで、直売所やネット販売などに最適！
ブロックやカット販売でも扱いやすく、量販店での取り扱いも拡大しています。

販促資材も各種
取り揃え中！
詳細は裏表紙へ



果実サイズ：3～7kg
平均5kg前後

フーコク交配
ぶちっと®

小玉品種
ぶちっと

※原寸大

各産地に適した栽培方法(1反あたり)

立体栽培

地這栽培



※株間や仕立てによるキロ数や玉数は目安です。諸条件により変動します。

収穫日数の目安(交配後日数)

●5～6月収穫：50日～45日 ●7～8月収穫：45日～40日

オススメ作型

ハウス終盤～トンネルなど、各産地の中盤作型に適する

シャリッと心地よく、**月光**のごとき輝く美味さ。

フーコク交配

ムーンフラッシュ



※2025年産地で栽培・出荷されたムーンフラッシュ

POINT 1 最大の特徴である糖度の高さ

ムーンフラッシュは、糖度15度前後とサンダーボルトを上回る高糖度を示し、鮮やかな果肉色と香り豊かな風味を有し、やや硬めの肉質によりブロック・カット販売にも適した品種です。



※2025年当社で
収穫した果実写真

POINT 2 バツグンの栽培性と収量性

ムーンフラッシュは低温期の着果性に優れつつ収穫期まで安定したツル持ちを維持。裂果が少なく収量性も高いため、計画的な出荷を可能にする栽培性に優れた品種です。

収穫日数の目安(交配後日数)

●5～6月収穫：52日～48日 ●7～8月収穫：48日～42日

オススメ作型


ハウス～トンネルなど、各産地の中盤作型に適する

アールスメロン

農研機構 共同育成

アールスアポロン

遂に出た！退緑黄化病（CCYV）耐病性のアールスメロン
退緑黄化病に悩む生産者の救世主！



○特性

- 退緑黄化病（CCYV）に耐病性
- えそ斑点病（MNSV）・つる割病（レース0,2）に抵抗性。
- うどんこ病に強い耐病性をもつ。
- ネット発現は安定し、均一に盛り上がる。
- 果皮は灰白緑色で黄化しにくい。
- 果形は正球形で稜角等の乱れが少ない。
- 果肉は黄緑色で厚く、糖度は15-16度と安定し、食味に優れる。
- 日持ち性が優れ、肉崩れが少なく可食期間も長い。



春秋系

特性

- 草姿は中葉・立性、節間はやや短い。
- 草勢はやや強く、高温下でも根張りが良い。
- 雌花着生は高温下でも安定している。
- 不良環境下でもネット発現は極めて安定している。
- 成熟日数の目安は53~57日程度。

夏系

特性

- 草姿はやや小葉・立性、節間はやや短い。
- 草勢は強く、高温下でも根張りが良い。
- 雌花着生は高温下でも安定している。
- 高温下でも過剰肥大しにくく、盛夏収穫の作型に適する。
- 成熟日数の目安は48~50日程度。

早春晩秋系

特性

- 草姿は中葉・立性、節間はやや短い。
- 草勢はやや強く、根張りが良い。
- 雌花着生は安定している。
- 春秋系よりも肥大が優れており、早春・晩秋収穫の作型に適する。
- 成熟日数の目安は58~60日程度。


秋冬系

特性

- 草姿は中葉・立性、節間はやや短い。
- 草勢はやや強く、根張りが良い。
- 雌花着生は安定している。
- 早春晩秋系よりも肥大が優れており、秋冬収穫の作型に適する。
- 収穫日数の目安は60日程度。

本品種は耐病性品種であり、ウイルスの量によっては感染するため、従来通り育苗ハウスや本圃における害虫対策を徹底した上で栽培しましょう。

作型例



○播種 ×定植 ▲交配 ●収穫

コナジラミ防除対策

1 圃場準備（育苗ハウス含む） 害虫をハウスに入れない

- ハウス内外の除草を徹底する。
- 定植前にハウス内の害虫を駆除する。
- ☞粘着シートをハウス内に設置し、密閉処理する。
- 連棟ハウスの場合、谷部も目合い0.4mm以下の防虫ネットを設置する。

2 育苗管理 害虫を増やさない

- 株元処理に登録のある殺虫剤（粒剤）を、育苗期前半に処理する。

出入口を二重にするか、防虫ネットを二重に貼る

UVカットフィルム ※育苗ハウスのみ

サイドに目合い0.4mm以下の防虫ネット

3 定植準備 苗に害虫を付けない

- 苗の移送中に野外の害虫が付かないように、トラックの荷台を幌などで覆う。
- 定植中は出入口を閉めて作業する。

ネットメロン

立体・地這いどちらでも栽培可能なネットメロン

- 高温期の栽培でもツル持ちが良い。
- つる割病（レース0,2）に抵抗性、うどんこ病に強い耐病性を持つ。
- 成熟日数は諸条件（天候・気温・草勢）により変動するが、50日程度である。

フーコク交配


ディーバ



糖度が高く安定し、
食味も抜群の緑肉メロン



※2024年青森県で栽培されたディーバの切り身写真



フーコク交配

プリモレッド



安定した栽培性と
ネット発現に優れる赤肉メロン



※2024年鳥取県で栽培されたプリモレッドが海外で販売されている様子



ネットメロン

ディーバ

特性

- 草姿はやや大葉で節間は短めである。
- 雌花の着生・着果は安定している。
- 高温期の栽培でもつる持ちが良い。
- つる割病（レース0,2）に抵抗性、うどんこ病に強い耐病性を持つ。
- ネットの発現は容易であり、安定して発現する。
- 果皮は灰緑色で黄化しにくく、離層の形成もみられない。
- 果形は正球形で乱れが少ない。
- 果肉は黄緑色で厚く、可食部が多い。
- 糖度は極めて安定しており、適切な管理により17度前後に安定する。
- 成熟日数は諸条件により変動するが52日程度である。



プリモレッド

特性

- 草姿は小葉で節間は中位でコンパクトである。
- 雌花の着生・着果は安定している。
- 高温期の栽培でもつる持ちが良い。
- えそ斑点病・つる割病（レース0,2）に抵抗性、うどんこ病に強い耐病性を持つ。
- ネットの発現は容易であり、安定して発現する。
- 果皮は灰緑色で黄化しにくく、離層の形成もみられない。
- 果形は正球形で乱れが少ない。
- 果肉は鮮やかなオレンジ色で厚く、果皮部のグリーン部も非常に薄い。
- 糖度は適切な管理により16度程度に安定する。
- 成熟日数は諸条件により変動するが、50日程度である。



産地での栽培の様子

地這栽培



鳥取県
2本4果
株間75cmでの栽培
10月収穫

立体栽培



長崎県
2本3果
株間60cmでの栽培
10月収穫

※上記は産地での栽培例であり、仕立て方法や株間などに関しては各産地に適した栽培を行ってください。

作型図

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒冷地	○	×	×	×	△	×	●	×	×	×	×	×
中間地		○	×	×	△	×	●	×	×	×	×	×
温暖地	○	×	×	×	△	×	●	×	×	×	×	×

○播種 ×定植 ▲交配 ●収穫

フーコク交配

ラッラエ

ディーバ& プリモレッドに
相性バッチリ！

病害抵抗性…えそ斑点病
つる割病 レース0,1,2
病害耐病性…つる割病 レース1,2y

穂木との親和性が高く、根張りが良いため
収穫期までツル持ちに優れる。



売場を彩る、萩原農場のプロモーションツール

のぼり

提供



大型のぼりは遠くから目立ち、店や売場へ自然に誘導します。立ち寄りを増やす、設置簡単で繰り返し使える販促資材です。

縦サイズ：1750mm× 440mm

卓上ミニのぼり

提供



レジ横や試食台、サンプル横で小さく目立つ案内役。新商品やおすそめを短い言葉で手に取りやすくします。置くだけ簡単、机を傷つけない台座で繰り返し使えます。

設置時サイズ：400mm× 170mm

ポスター

提供



レジ横や試食台、盛付け前に最適。品種名を大きく表示し、今並ぶ果実が何かを一目で明示。売場がぱっと華やぎ、思わず手が伸びる演出に。

基本サイズ：A2 (420mm× 594mm)

品種シール

販売



品種名シールは購入後も品種が分かる目印。食べ比べやリピート購入がしやすくなり、口コミにもつながります。見た目も整って売場が明るく華やぎます。

ぷちっと

提供



直売所などでの販売機会の多いぷちっとは販売コーナーを彩る資材を中心に、幅広くラインナップ！

サイズ：1760mm× 450mm

サイズ：420mm× 150mm

卓上ミニのぼり



サイズ：420mm× 150mm

提供

ポスター



A2 (420mm× 594mm)

提供

品種シール



販売

化粧箱



縦 横 高さ
240mm× 240mm× 300mm

※のぼりのサイズは、品種により一部寸法が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※販売資材の価格は当社までお問い合わせ下さい。

※本掲載以外の品種もご用意のある品種がございます。詳細はお気軽にお問い合わせください。

Company Information

株式会社 萩原農場

住所 〒636-0222 奈良県磯城郡田原本町法貴寺984

TEL 0744-33-3233

FAX 0744-33-4332

関東連絡所 〒259-0151

神奈川県足利上郡中井町井ノ口2240-11

TEL:0465-81-0558 / FAX:0465-81-3469

スイカとメロンの可能性を未来に広げる
株式会社 萩原農場

Instagram



LINE

YouTube

